

RELAÇÃO DE SEMENTES NOCIVAS PROIBIDAS E TOLERADAS E LIMITES MÁXIMOS PERMITIDOS PARA O COMÉRCIO DE SEMENTES DE OLERÍCOLAS, FORRAGEIRAS E GRANDES CULTURAS

Nome Científico	Nome comum	Limites máximo		
		Olerícolas	Forrageiras	Grandes culturas
Nocivas proibidas				
Cuscuta spp	Cuscuta cipó-chumbo, fios-de-ovos	zero	zero	zero
Cyperus rotundus, L.	Tiririca-verdadeira	zero	zero	zero
Echium plantagem, L.	Borrago	-	-	zero
Eragrostis plana, Ness	Capim-annoni	-	zero	zero
Euphorbia heterophylla, L.	Leiteira, amendoim-bravo	-	-	zero
Oryza sativa, L.	Arroz-preto	-	zero	zero
Rumex acetosella, L.	Linguinha-de-vaca	-	zero	zero
Sorghum halepense (L.), Pers.	Capim-maçambará, Sorgo-de-alepo	zero	zero	zero
Vigna unguiculata (L.) Walp.	Feijão-miúdo	-	-	zero
Nocivas Toleradas				
Acanthospermum hispidum, L.	Carrapicho-de-carneiro	-	-	10
Aeschynomene rudis, Benth	Angiquinho	-	-	10
Amarantus spp	Caruru-gigante, bredo, Carur-de-espinho	10	20	15
Anthemis cotula, L.	Macela-fétida	10	30	-
Avena fatua, L. e A. barbara (Pott.), Link	Aveia-silvestre, Aveia-selvagem	-	-	5
Bidens pilosa, L.	Picão-preto	-	-	10
Borreria alta, DC.	Língua-de-vaca	-	-	10
Brachiaria plantaginea (Link,) Hitch.	Capim-marmelada, papuã	-	-	10
Brassica campestris, L. e Sinapis arvensis, L.	Mostarda-silvestre, mostarda-selvagem	-	10	10
Cassia tora L. e C. occidentalis, L.	Fedegoso	-	-	10
Cenchrus echinatus, L.	Capim-carrapicho, Timbete	-	-	10
Cenchrus echinatus, L.	Ervsa-formigueira, ançarinha	10	-	-
Cirsium vulgares (Sav), Ten	Cardo	-		30

<i>Croto glandulosus</i> (L.), Muell.	Gervão-branco	-	-	10
<i>Cyperus esculentus</i> , L.	Tiririca-amarela	5	10	-
<i>Cyperus sesquiflorus</i> (tor.) Matt. et Kunk	Capim-santo, Capim-de- um-só-botão	5	-	-
<i>Cyperus</i> spp	Tiririca-do-brejo, Tiririca- falsa	5	-	5
<i>Digitaria insularis</i> (L.), Fedde	Capim-amargoso	-	30	-
<i>Diodia teres</i> Waalt.	Poaia-do-campo, diodia	-	20	-
<i>Echinochloa crusgalli</i> (L.) Beauv. e <i>E. colonum</i> (L.) Link	Capim-arroz, colônia	10	-	10
<i>Echium plantaginum</i> , L.	Borrago	-	1	-
<i>Euphorbia hetophylla</i> , L.	Leiteira, Amendoim- bravo	-	20	-
<i>Hiptis suaveolens</i> , Poit.	Mata-pasto, fazendeiro	-	20	-
<i>Ipomoea aristolchiaefolia</i> (H.B.K), Don.	Corde-de-viola, corriola, campanhia	10	-	-
<i>Ipomoea purpurea</i> , Lam.	Corde-de-viola, corriola, campanhia	10	-	-
<i>Oryza sativa</i> , L.	Arroz-vermelho	-	-	8
<i>Pennisetum setosum</i> (Swartz), L. Rich. Pers	Capim-oferecido, Capim- custódio	-	30	15
<i>Polygonum convolvulus</i> , L.	Cipó-de-veado	10	-	10
<i>Polygonum</i> spp	Erva-pessegueira, enredadeira, erva-de- bicho	10	10	10
<i>Rapistrum rugosum</i> (L),m SII	Mostarda-comum	-	30	20
<i>Raphanus raphanistrum</i> , L.	Nabiça	10	5	5
<i>Rumex acetosella</i> , L.	Linguinha-de-vaca	5	-	-
<i>Rumex crispus</i> , L. e <i>R.</i> <i>obrusifolius</i> , L.	Língua-de-vaca	-	10	10
<i>Sida</i> spp	guanxuma, guanxuma- branca, malva-preta	-	20 (*)	10
<i>Sylybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Cardo-branco	-	30	-
<i>Solanum</i> spp.	Maria-pretinha, jóia, Fumo-bravo	10	15	15
<i>Xantium amercanum</i> Walt.	Carrapichão	-	-	15
<i>Xantim</i> spp.	-	-	15	-

(*) O limite máximo específico de *Sida* spp, para a produção, transporte e comércio de sementes forragens do gênero *Brachiaria* fica excepcionalmente estabelecido em 30 (trinta) sementes por peso da amostra analisada.